

Astrofotografie

Das OST ist natürlich auch geeignet, um damit Astrofotografie zu betreiben. Da drei unserer [dezidierten Astro-Kameras](#) über ein angebautes Filterrad verfügen, können damit auch hübsche Bilder aufgenommen werden - dieser Artikel soll eine Anleitung dafür sein und unsere Fortschritte dokumentieren. Er soll nach und nach erweitert werden und erhebt deshalb keinerlei Anspruch auf

Vollständigkeit. 😊

Die bisher aufgenommenen Bilder finden sich im Moment hier. Auch in diesem Wiki soll eine [Galerie](#) entstehen. Nach dem Klick auf die dort gezeigten Bilder findet man einige weitere Informationen über die Entstehung der Bilder.

Aufnahmen mit der CCD

Objektauswahl

Im allgemein müssen die zu beobachtenden Objekte lang genug am Nachthimmel und nicht zu nahe am Horizont stehen. Um die negativen Einflüsse der Atmosphäre zu minimieren sollte das Beobachtungsobjekt wenigstens 20° über dem Horizont stehen. In Richtung Osten (Berlin) ist die Lichtverschmutzung wesentlich größer und damit auch die Beobachtungsbedingungen ungünstiger. Weiterhin sollten die Beobachtungsbedingungen in der Aufnahmenacht berücksichtigt werden. Bei starkem Seeing und herabgesetzter Transparenz der Atmosphäre lohnen Deepsky-Objekte eher nicht. Beobachtbare Objekte sind:



 Gesichtsfeld der ST-8 im Vergleich zur Größe des Mondes

1. Mond - passt nicht ins Gesichtsfeld → Mosaikaufnahmen
2. Planeten - Merkur & Venus immer in der Nähe der Sonne → nur kurz nach Sonnenuntergang bzw. vor Sonnenaufgang beobachtbar
3. Sternhaufen (einige offene Sternhaufen passen nicht ins Gesichtsfeld)
4. Galaxien - Mondlicht stört (z.B. M31 passt nicht ins Gesichtsfeld)
5. Nebel - Mondlicht stört
6. Sterne - nur bedingt sinnvoll

- nützliche Internetseiten:
 - [Telescopius](#)

- [Simbad](#)
- weitere können [hier](#) gefunden werden

Filterwahl


Es stehen viele verschiedene [Filter](#) zu Verfügung. Da die [Filter](#) ein Großteil der Photonen absorbieren verlängert sich die Belichtungszeit erheblich. Je nach Objekt lohnen sich nur bestimmte Filter. Für Emissionsnebel sind z.B. auch H-Alpha/Beta-Filter und OIII-Filter angebracht. Für Sterne und Galaxien sollte man Breitbandfilter (U/B/V/R/I) nutzen. Aufnahme in B-, V- und R-Filtern ermöglicht die spätere Erstellung eines RGB-Bildes.


Belichtungszeiten


- extend here - vielleicht eine Minigalerie
- [40min. Aufnahme](#) - Sterne bis V ≥ 20 mag möglich

Korrekturaufnahmen




 Darkframe der ST-8




 Flatfield der ST-8

Um die Aufnahmen der Objekte von störenden Einflüssen, verursacht durch Effekte der CCD und Fehlern in der Optik, zu befreien sind Korrekturaufnahmen nötig. Darkframes sind Aufnahmen ohne Belichtung, sodass Elektronen vom Bias-Strom und vom Dunkelstrom (durch thermische Anregung) gezählt werden. Diese werden dann von der eigentlichen Aufnahme abgezogen. Flatfields sind Aufnahmen, die durch Belichten mit einer Flatfieldfolie, oder gegen ein gleichmäßig belichtetes Stück Himmel/Wolken/Wand, aufgenommen werden. Dies dient zur Korrektur von Fehlern und Verschmutzungen in der Optik des Teleskops.


5. Masterdark von Rohbildern subtrahieren (im Rahmen der Stapelbearbeitung)




Stapelbearbeitung starten



Stapelbearbeitung: Anfangsdatei und Zielfeld festlegen




Stapelbearbeitung: zweiten Bearbeitungsschritt auswählen - "Bild subtrahieren"




Stapelbearbeitung: Masterdark auswählen

6. entstandene Bilder durch Masterflat teilen (im Rahmen der Stapelbearbeitung)




Stapelbearbeitung: dritten Bearbeitungsschritt auswählen - "Bild dividieren"

7. entstandene Bilder auffaddieren





Stapelbearbeitung: vierten Bearbeitungsschritt auswählen – “Zur Zieldatei addieren”

- 8. eventuell unterschiedliche Belichtungszeit ausgleichen
- 9. gleiche Objekte in den Bildern markieren



Sterne auswählen, die als Ankerpunkt für Kreuzkorrelation dienen

- 10. zu RGB-Bild kombinieren (mit Verschiebung)




Auswahlfenster für die einzelnen Aufnahmen


Die Funktion auswählen, welche die drei einzelnen Aufnahmen zu einem RGB-Bild zusammensetzt (nicht vergessen in den jeweiligen Bildern zwei Sterne zu markieren)

- 11. falls die Verschiebung nicht perfekt ist kann man einen Bereich markieren und die Farblayer zurechtrücken
- 12. per Rechtsklick kann man den Schwarztton (Hintergrund) und den Weißton (weißer Stern)

definieren



Hintergrund anpassen



Weißwert anpassen

13. Bild zurecht schneiden

Nachbearbeitung

Bei der Nachbearbeitung der erstellten Bilder kann man noch mit dem Kontrast, der Sättigung, dem Weißabgleich o.ä. herumspielen um weitere Details zum Vorschein zu bringen.

- via *Fitswork* unter Bearbeiten → Farbfunktion
- via *PS/Gimp* ...

Aufnahmen mit einer DSRL

Es steht die digitale Spiegelreflexkamera Canon EOS 700D zur Verfügung. Diese ist v.a. bei Kurzzeitbelichtungen interessant (bis 1/4000s möglich), weil unsere Astro-CCDs nur minimale Belichtungszeiten von 0,09 Sekunden erlauben. Die Objekte müssen dementsprechend hell genug sein. Das Gesichtsfeld der DSLR ist auch größer als das unserer [CCDs](#).

Interessante Objekte sind z.B.:

- Planeten
- der Mond
- Kometen

Einen Artikel zur [Steuerung von DSLR-Kameras mittels eines Computers](#) haben wir auch



Unsere neue Kamera, die QHY600M, ist eine CMOS-Kamera und erlaubt daher auch deutlich kürzere Belichtungszeiten als die alten CCD-Kameras und hat auf der anderen Seite nicht die Nachteile einer DSLR-Kamera, wie z.B. einen hohen Dunkelstrom. Mehr hierzu wenn wir mehr Erfahrungen



gesammelt haben...

Lucky imaging howto

Kommt hier hoffentlich bald...

Aufnahmen mit einer Videokamera

So eine haben wir auch...

To be continued...

From:

<https://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/> - **OST Wiki**

Permanent link:

<https://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/doku.php?id=de:ost:ccds:astrofotografie>

Last update: **2021/06/21 13:15**

